



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PERİODONTOLOJİ A.B.D
REZEKTİF KEMİK CERRAHİSİYLE BİRLİKTE KRON BOYU UZATMA İŞLEMİ İÇİN
BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU

Doküman Kodu: HD.RB.18	Yayın Tarihi:01/06/2017	Revizyon No:1	Revizyon Tarihi:15/04/2022	Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/2
---------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	------------------------------

PROTOKOL NO:

Revizyon Tarihi:15/04/2022

Rezektif kemik cerrahisiyle birlikte kron boyu uzatma işleminin ne olduğu, ne için yapıldığı, tedavi sonrasında karşılaşılabilecek problemler ve alternatif tedaviler hakkında bilgilendirildim ve bunun sonucunda bana rezektif kemik cerrahisiyle birlikte kron boyu uzatma işleminin yapılmasına izin verdim. Operasyon sonrasında diş hekimimin tarif ettiği bakım kurallarının tümüne uymayı kabul ettim.

Tedavi İçeriği

Lokal anestezi altında yapılan dişeti kesisini takiben dişlerin üzerindeki dişeti kaldırılır. Turla dönen aletin ucuna takılan frez yardımıyla gerekli miktarda kemik dişin çevresinden kaldırılır. Bu işlem kaldırılacak kemiğin miktarına göre el aletleri ile de yapılabilir. Dişeti dikilir, pembe renkli koruyucu madde ile operasyon bölgesi örtülür. Gerekli görüldüğü takdirde antiseptik ağız gargarası ve antibiyotik verilebilir. Operasyondan bir hafta sonra bu koruyucu madde ve dikişler alınır.

Rezektif Kemik Cerrahisiyle Birlikte Kron Boyu Uzatma İşlemine Alternatif Tedaviler

- 1- Hiçbir tedavi uygulanmaması
- 2- Ortodontik olarak dişin sürdürülmesi veya bazı durumlarda kombine olarak dişlerin gömülmesi ve protetikrestorasyon.

Lokal Anestezi İle İlgili Oluşabilecek Sorunlar:

- 1- Lokal anesteziye karşı önceden geçirilmiş bir alerji geçmişiniz varsa, kalp, kan hastalıkları, yüksek tansiyon ve diğer genel sağlıkla ilgili bir rahatsızlığınız varsa mutlaka hekiminizi uyarınız. Yanlış beyan nedeni ile olabilecek sorunlardan hekiminiz sorumlu değildir.
- 2- Lokal anestezi uygulaması sırasında ve sonrasında ağrı, şişlik, yanma, enfeksiyon, geçici ya da kalıcı sinir harabiyeti ve beklenmeyen alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Alerjik reaksiyonlar; kaşıntı, döküntü, bulantı, kusma, solunum zorluğu, kalp atışında artış (taşikardi) veya azalma (bradikardi) çok düşük bir ihtimalle ölüm şeklinde olabilir.

Dişeti Tedavisi İle İlgili Oluşabilecek Sorunlar:

- 1- Tedavi öncesi, sırası ve sonrasında eğitim, araştırma veya arşiv amaçlı kullanılmak üzere ağız içi fotoğraf alınabilir. Bu fotoğraflar kullanılırken kimlik bilgileriniz saklı tutulacaktır.



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PERİODONTOLOJİ A.B.D

REZEKTİF KEMİK CERRAHİSİYLE BİRLİKTE KRON BOYU UZATMA İŞLEMİ İÇİN

BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU

Doküman Kodu: HD.RB.18	Yayın Tarihi:01/06/2017	Revizyon No:1	Revizyon Tarihi:15/04/2022	Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/2
---------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	------------------------------

- 2- Tedavi sırasında lokal anestezi uygulaması (sprey, jel veya enjeksiyon ile uyuşturma) gerekebilir.
- 3- Tedavi sırasında hafif şiddette ağrı hissedilebilir.
- 4- Dişeti tedavisi mevcut protezlerin çıkarılmasını ve dişeti tedavisi sonrası bu protezlerin yenileri ile değiştirilmelerini gerektirebilir.
- 5- İlk 1-2 günde ağrı, kanama, hafif şişlik, abse ya da deride renk değişimi (ekimoz) oluşabilir (Bunları engellemek için hekimin tavsiyelerine maksimum derecede uyulmalıdır).
- 6- Dişeti hastalığının şiddetine göre dişlerde aralanma, dişeti çekilmesi, dişlerin arasına daha kolay gıda birikmesi gibi durumlar ortaya çıkabilir.
- 7- Tedavi sonrasında dişlerde hava alma, sıcak-soğuk hassasiyeti oluşabilir.
- 8- Tedavi sırasında dişlerde geçici bir dönem sallanma artışı oluşabilir.
- 9- Dişlerin üzerine bastırınca hafif ağrı hissedilebilir.
- 10- Canlı bir doku olan dişetin yapılı tedaviye verdiği yanıt (iyileşme) hastadan hastaya değişiklik göstermektedir. Bu yüzden tedaviye yanıt alınamayan durumlar olabilir ve tekrarlayan seanslar gerekebilir.
- 11- Bazı dişeti tedavilerinden sonra dokuların tamiri 3-4 hafta sürebilmektedir. Bu nedenle dişeti tedavisi sonrasında protez yapımı için 1 ay kadar beklenmesi gerekebilir.
- 12- Gerekli dişeti tedavilerinden sonra ilk kontrol randevusu 3 ay sonra, takip eden kontroller genelde 6 ay aralıklarla yapılmaktadır.
- 13- Bu tedavi sonucunda tam iyileşme olabileceği gibi, gerekli görülen durumlarda ileri periodontal cerrahi tedaviler de önerilebilir.

Operasyon Bölgesinin ve Tüm Ağızın Günlük Bakımı için Onay

Opere edilen bölgenin uygun şekilde iyileşebilmesi için yapılması gereken günlük ağız bakımı konusunda bilgilendirildim ve talimatlar doğrultusunda bu bakımı yapmayı kabul ettim. Operasyon sonrası 3-4 hafta boyunca kesinlikle sigara içilmemesi gerektiği konusunda bilgilendirildim ve bu süre zarfında içmeyeceğimi taahhüt ettim. Ayrıca doktoruma periyodik kontrollere geleceğime söz verdim. Cerrahi işlem sonrası oluşan herhangi bir problem konusunda doktorumu bilgilendirmek benim sorumluluğumdur.



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PERİODONTOLOJİ A.B.D
REZEKTİF KEMİK CERRAHİSİYLE BİRLİKTE KRON BOYU UZATMA İŞLEMİ İÇİN
BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU

Doküman Kodu: HD.RB.18	Yayın Tarihi: 01/06/2017	Revizyon No: 1	Revizyon Tarihi: 15/04/2022	Sayfa No/Sayfa Sayısı: 1/2
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Yukarıda yazılanların hepsini okuduğumu ve anladığımı, rezektif kemik cerrahisiyle birlikte kron boyu uzatma işlemi hakkında bilgilendirildiğimi ve bütün sorularımın cevaplandığını onaylarım.

Hastanın; **Bilgilendirmeyi ve İşlemi yapan Aday Diş Hekimi / Diş Hekimi;**
Adı Soyadı: **Adı Soyadı:**
TC Kimlik No: **İmzası:**
İmzası:

Sorumlu Öğretim Üyesi; **Hastanın velisi/ yasal temsilcisi;** **Görüşme tanığının;**
Adı Soyadı: **Yakınlık Derecesi:** **Adı Soyadı:**
İmzası: **Adı Soyadı:** **İmzası:**
İmzası:

Tarih://..... **Saat:**.....

* **Yasal Temsilci:** Vesayet altındakiler için vasi, reşit olmayanlar için anne- baba, bunların bulunmadığı durumlarda 1. derece kanuni mirasçılardır (Yasal temsilcinin yakınlık derecesini belirtiniz.).